


# Étape Saint-Éloy-la-Glacière - Saint-Bonnet-le-Chastel

Ambert Livradois-Forez - Saint-Éloy-la-Glacière



(CDTE)



## Infos pratiques

Pratique : Équestre

Durée : 1 jour

Longueur : 29.5 km

Dénivelé positif : 499 m

Difficulté : Moyen

Type : Itinérance

# Itinéraire

**Départ** : Saint-Éloy-la-Glacière

**Arrivée** : Saint-Bonnet-le-Chastel

**Communes** : 1. Saint-Éloy-la-Glacière

2. Fournols


3. Chambon-sur-Dolore

4. Saint-Germain-l'Herm

5. Saint-Bonnet-le-Bourg


6. Saint-Bonnet-le-Chastel

## Profil altimétrique



Altitude min 830 m Altitude max 1103 m

# Sur votre chemin...



 Pic noir (A)

 Petite chouette de montagne (B)

# Toutes les infos pratiques

# Sur votre chemin...

---



## Pic noir (A)

Les picidés sont des oiseaux de la taille d'un moineau à celle d'une corneille. Ils sont adaptés morphologiquement à la vie arboricole. Leurs pattes solides sont pourvues de quatre longs doigts (rarement trois) terminés de griffes puissantes, deux tournés vers l'avant et deux vers l'arrière, facilitant la préhension des troncs et des branches. La queue possède des rectrices cornées très rigides et pointues qui leur servent de point d'appui bas pour le corps dans leur station verticale le long d'un tronc ou d'une branche. Ils ont un bec droit, tronqué et tranchant à son extrémité. Ils s'en servent pour creuser le bois mort ou vivant pour trouver leur nourriture ou creuser leur loge de nidification.

C'est le plus grand des pics (46 cm). Aisément reconnaissable par sa couleur entièrement noire, avec une calotte rouge vif s'étendant du front jusqu'à l'arrière de la nuque chez le mâle, la femelle pour sa part présentant seulement une tache rouge à l'arrière de la calotte. La langue des pics est effilée, très longue, visqueuse et pourvue de nombreux corpuscules de tact, dont l'extrémité petite, plate et pointue, est ornée de petits crochets. Elle peut être projetée loin en avant. Leurs tarses sont courts et les doigts pourvus d'ongles solides et recourbés. Deux sont dirigés en avant et deux en arrière, ils leur permettent de grimper facilement aux arbres tout en prenant appui sur les plumes de la queue, excessivement robustes.

Crédit photo : Oiseau.net



## Petite chouette de montagne (B)

Les chouettes et hiboux occupent un assez large choix d'habitats. Certains sont exclusivement forestiers, comme la hulotte et la Chouette de Tengmalm qui nichent dans des cavités arboricoles, bien souvent pourvues par les pics. D'autres espèces sont plus anthropophiles, ou du moins ne dédaignent pas vivre dans ou en périphérie de nos villes et villages.

Les petites chouettes de montagne que sont la chouette de Tengmalm et la chevêchette d'Europe, bien plus discrètes sont aussi présente dans les sapinières d'altitudes, leurs mœurs crépusculaires ou nocturnes et leur grande discrétion leur ont longtemps permis de passer inaperçues.

Les rapaces nocturnes sont avant tout des consommateurs de micro-mammifères. Tout n'est qu'une question de taille cependant, le Grand-duc a un régime alimentaire assez varié (petits mammifères, oiseaux, batraciens...), tandis que le Petit-duc jette plus particulièrement son dévolu sur les insectes. Cette propension à la chasse de micro-mammifères (rat, souris, mulot, musaraigne, loir, lérot, etc.) est un précieux auxiliaire d'ailleurs pour les scientifiques s'intéressant à ces animaux : la récolte puis l'analyse des ossements présents dans les pelotes de réjection des rapaces est une des méthodes les plus utilisées d'inventaire.

Crédit photo : Parc Livradois Forez